Compañeros en Chocolate Napol's



Nombre científico: *Strix virgata*

Familia: Strigidae

Nombre local: Buho cariblanco



Acerca de:

Búho grande y común de tierras bajas y laderas de montaña. Se encuentra en bosques, selvas, plantaciones, jardines, incluso en pueblos.

Se percha de día a diferentes niveles en zonas densas de árboles grandes, aunque de noche puede cazar desde perchas más bajas, como postes de cercas y letreros en caminos. Anida en agujeros en árboles, generalmente nidos viejos de otras aves.

Su ulular ronco y variado asemeja los ladridos de un perro.

Se alimenta de insectos como cucarachas, escarabajos y grillos. También de murciélagos, pequeños reptiles, ranas, roedores y probablemente aves pequeñas.



Fuentes: birdscolombia.com | Ebird.org

Créditos: Alejandra Osejo | Angela Mendoza-Henao | Diego Marín

Fotografía: Chloe and Trevor Van Loon






Fuentes: birdscolombia.com | Ebird.org Créditos: Alejandra Osejo | Angela Mendoza-Henao | Diego Marín|

Fotografía: Chrissy McClarren y Andy Reago

Compañeros en Chocolate Napol's



Nombre científico: *Dendrobates truncatus*

Familia: Dendrobatidae

Nombre local: Ranita

rayada

Acerca de:

Es una especie diurna, territorial y se encuentra en zonas boscosas con abundante hojarasca. Deposita sus huevos oviposición en la hojarasca húmeda y, cuando eclosionan los renacuajos, los machos adultos se encargan de transportarlos en la espalda para luego depositarlos en diversos reservorios de agua de plantas hospederas o agujeros en los árboles, donde encuentran alimento y refugio.

Su piel presenta alcaloides como estrategia de defensa que pueden llegar a ser nocivos al ser humano. Estos alcaloides pueden variar en cantidad y composición entre poblaciones de la misma especie.

Se alimenta principalmente de hormigas y ácaros.



Fuentes: Cárdenas-Ortega et al., (2019). Catalogo de anfibios y reptiles de Colombia.

Créditos: Alejandra Osejo | Angela Mendoza-Henao | Diego Marín| Fotografía: José Gabriel Julio Guzmán





Nombre científico: *Alouatta seniculus*

Familia: Atelidae

Nombre local: Mono aullador



Acerca de:

Estos primates son diurnos y arbóreos. Pueden formar grupos de entre tres y siete individuos, compuestos por un macho adulto y dos o más hembras y sus crías. Tambien se pueden encontrar machos adultos solitarios.

Se alimentan principalmente de hojas jóvenes y frutos de palmas.

Cumplen una función muy importante como dispersores de semillas.

Ocupan todo tipo de bosques aunque muestran cierta preferencia por bosques inundados a orillas de ríos y lagunas, así como zonas pantanosas.

Utilizan los estratos medios y altos del bosque en los que se mueven de manera silenciosa.

Su fuerte vocalización puede oírse a kilómetros de distancia. Se ha propuesto que cumple una función en la defensa del territorio de los grupos.



Fuentes: bioweb.bio | catalogo.biodiversidad.co Créditos: Alejandra Osejo | Angela Mendoza-Henao | Diego Marín| Fotografía: Allan Harris

Compañeros en Chocolate Napol



Nombre científico: *Dryocopus lineatus*

0000

Familia: Picidae

Nombre local: Carpintero

copetirojo



Acerca de:

Carpintero grande, habita los bordes de los bosques y otras arboledas abiertas.

Agujerea los troncos de los árboles en busca de insectos. Comen principalmente insectos, especialmente hormigas, escarabajos y sus larvas, además de algunas semillas, por ejemplo de platanillo, frutos y nueces.

Su canto —aunque varía entre los ejemplares de su amplia zona de distribución— es un alto, repetitivo y rápido uic-uic-uic. Ambos sexos tamborilean en los troncos de los árboles.



Fuentes: birdscolombia.com | Ebird.org Créditos: Alejandra Osejo | Angela Mendoza-Henao | Diego Marín|